

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ (ATOPIC DERMATITIS)

ภาควิชาตจวิทยา

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผืนภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ คืออะไร

เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เป็นๆ หายๆ พับบอยในเด็ก ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีแนวโน้มทางพันธุกรรมอยู่เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ผู้ป่วยมักมีประวัติเยื่อบุตาอักเสบ แพ้อากาศ ไอ จามบ่อย ๆ หรือหอบหืด โดยเฉพาะเวลาที่อากาศรอบตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ตอนเข้ามีเดือนในครอบครัวผู้ป่วยมักมีประวัติโรคภูมิแพ้ของเยื่อบุต่าง ๆ เช่น เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ แพ้อากาศ ใจจามบ่อย ๆ หอบหืด หรือผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ไม่ได้เกิดจากการแพ้อาหารหรือสารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดจากผิวหนังของผู้ป่วยไว (sensitive) ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งสภาพร้อน เย็น แห้ง ชื้น เชื้อโรคและสารเคมีที่ระคายผิวหนัง อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวเลยก็เป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะความผิดปกติซ่อนเร้นอยู่ในยีนของครอบครัวผู้ป่วยโดยไม่เกิดอาการก็ได้

อาการและลักษณะของผีนแพ้

ผู้คนหันมาสนใจการค้นหากลุ่มชนะเป็นผู้คนเดียวหรือมีตุ่นแดงนูน ตุ่มน้ำใส ซึ่งเมื่อแตกออกเป็นน้ำเหลืองให้เยิ้มแล้วกลิ่ยเป็นสะเก็ดแข็ง ถ้าผู้คนนี้เป็นมานานเข้าสู่ระยะเรื้อรัง จะพบเป็นแผ่นหนาแข็ง มีขุย ตำแหน่งที่พบผู้คนแตกต่างกันได้ตามวัยของผู้ป่วยในเด็กเล็ก ช่วงชาวปีแรก ผู้คนหันมาอักเสบจะพบมากบริเวณใบหน้า ศีรษะ เด็กมักจะเอ่าแก้มหรือศีรษะถูกไก่กับหมอน ผ้า ที่นอน เพราะผู้คนค้นหากวัยเรียน และผู้ใหญ่ ผู้คนหันมาอักเสบพบมากในบริเวณข้อพับแขน ข้อพับขา คอ ใบหน้า และผู้คนหันตำแหน่งที่มีการเสียดสีแตกในรายที่เป็นมากๆ ผู้คนเกิดทั่วร่างกายได้

มีวิธีทดสอบภัยแพ็ผิวนังชนิดนี้หรือไม่ ?

การวินิจฉัยโรคผิวนังอักเสบภูมิแพ้ อาศัยประวัติที่ผู้ป่วยมีอาการคันตามตัว เป็นผื่นผิวนังอักเสบ เป็นๆ หายๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่าง ๆ ผู้ป่วยครองและผู้ป่วยมักมีคำรามเสมอว่ามี วิธีทดสอบหรือไม่ว่าผู้ป่วยแพ้อะไร เช่น การสะกิดฉีด หรือแพะยา ทดสอบได้ผิวนัง หรือใช้วิธีการเจาะเลือด ตรวจว่าผู้ป่วยแพ้อะไร คำตอบคือ ไม่มีวิธีการทดสอบดังกล่าวที่จำเป็นต้องทำในการดูแลผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยและ ญาติควรสังเกตตัวเองว่าเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมชนิดใดแล้วทำให้ผิวนังอักเสบหรือขึ้น ก็ควรหลีกเลี่ยงสภาวะ แวดล้อมเหล่านั้น

อะไรบางที่ทำให้ผู้คนกำเริบมากขึ้น?

๑. สภาระแวดล้อม เช่น สภาระที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่ต้องการ เน้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เพื่อนมีอาการคันมากขึ้น
 ๒. เชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา อาจแทรกซ้อนทำให้เกิดการติดเชื้อบนผิวนังของผู้ป่วย ผิวนังที่อักเสบอยู่เดิมจะกำเริบมากขึ้น กรณีที่สังสัยว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อน ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
 ๓. ฤทธิการณ์ ผื่นผิวนังอักเสบมักมีอาการมากขึ้น ในช่วงฤดูหนาว เพราะความชื้นในอากาศต่ำ อากาศแห้ง เย็น ทำให้ผิวนังผู้ป่วยคันและเป็นผื่น ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน เพราะอากาศที่

ร้อนทำให้เหงื่อออกร้าว เกิดอาการคันและเกิดผื่นเรื้อรังเดียวกับในฤดูหนาว

๔. เสื้อผ้า เครื่องนุ่มนิ่ม และเครื่องประดับที่มีขน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ จะทำให้เกิดการคันเพิ่มเติม

๕. សูบ ครีม โลชั่น และผงซักฟอกที่ใช้เป็นประจำ สารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ละลายไขมัน หรือ/และอาจมีส่วนประกอบที่ก่ออาการระคายเคืองแก่ผิวนังทำให้เกิดอาการคันและเป็นผื่นผิวนังอักเสบได้ง่าย

๖. อาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ประมาณ ๑๐% พบร่องอาหารบางชนิดเป็นตัวกระตุ้นให้ผื่นแย่ลง มักพบในผู้ป่วยเด็ก เช่น นม ไข่ ถั่วเหลือง เนื้อสัตว์บางประเภท

๗. จิตใจที่วิตกกังวลความเครียดก็สามารถทำให้โรคกำเริบได้

วิธีการดูแลและรักษา

๑. หลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้โรคกำเริบมากขึ้น เช่นไม่อยู่ในห้องปรับอากาศที่เย็นจัด ไม้อบน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นหรือร้อนจัด และควรหลีกเลี่ยงภาวะที่ทำให้เหงื่อออกร้าว

๒. ควรรับประทานยาต้านภูมิแพ้ตามนิยมลดอาการคัด เมื่อมีอาการคันควรรับประทานยาต้านภูมิแพ้วันละ ๒-๓ ครั้งติดต่อ เว้น ๕-๗ วัน เพื่อลดอาการคัน เพราะอาการคัดทำให้ผู้ป่วยต้องแกะเกาผิวนัง ผื่นผิวนังที่อักเสบจะกำเริบขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่นได้แก่คลอฟานิลามีน สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ข้อที่ควรระวังคือ yanex ผลข้างเคียงคือ อาการรุนแรง

๓. ยาหากกลุ่มนี้ต้องใช้นานา อาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้ ถ้าใช้ยาไม่ถูกต้อง

๔. กรณีที่มีตุ่มหนองเกิดแทรกซ้อนบนตุ่มหรือผื่นแดง แสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ควรปรึกษาแพทย์ เพราะผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

แหล่งที่มาของข้อมูล: <https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=๑๓> สีบคัน

ข้อมูลวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓