

มาตรฐานสากลในเด็กและวิธีรักษาที่ถูกต้องกันเสมอ

ภาควิชาคุณการเวชศาสตร์
ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ไขนสคืออะไร

ไขนสเป็นโพรงอากาศในกะโหลก ซึ่งพบได้ที่หัวคิ้วขอบจมูกและโหนกแก้ม หน้าที่ปกติของโพรงไขนสไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่อาจทำให้กะโหลกเบา เสียงก้อง สร้างเมือกและภูมิคุ้มกันให้กับโพรงจมูก โดยปกติเมือกโพรงไขนสจะไหลเข้าสู่โพรงจมูก ผ่านช่องเล็ก ๆ (Ostium) ที่ผนังข้างจมูกเพื่อใช้ในการต่อสู้เชื้อโรคและรายสิ่งแปลกลอมจากจมูกลงสู่ลำคอ หรือออกทางจมูก

การเกิดไขนสอักเสบ

เมื่อจมูกเกิดอาการบวม เช่น เป็นหวัด จมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือมีสิ่งแปลกลอมอยู่ในจมูก จะทำให้ช่องติดต่อระหว่างโพรงไขนสและจมูกดังกล่าวอุดตันและเกิดคั่งค้างของน้ำเมือกในโพรงไขนส และเมื่อเชื้อโรคจากจมูกเข้าสู่โพรงไขนสได้ก็จะแบ่งตัว และทำให้เกิดการติดเชื้อของโพรงไขนสและเมหงอกเกิดขึ้น ทำให้จมูกบวมมากยิ่งขึ้น จึงเรียกว่าเกิดโรค "ไขนสอักเสบ" อาการของโรคไขนสอักเสบอาจแตกต่างกันระหว่างในเด็กและผู้ใหญ่ โดยในผู้ใหญ่จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ และอ่อนเพลียได้มากกว่าในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมักไม่ค่อยมีอาการดังกล่าว เมือช่อง (Ostia) ที่ติดต่อระหว่างโพรงไขนสและจมูกเปิดออกเป็นครั้งคราว หนองและเมือกจากโพรงไขนสก็จะไหลลงสู่จมูกและคอทำให้เด็กเกิดอาการดังนี้

- น้ำมูกไหลโดยสิ่งของน้ำมูกอาจเป็นสีเขียว เหลือง หรือขาวเป็นหนอง
- ไอ เพราะเมือกหรือหนองไหลลงคอ กระตุ้นให้เกิดอาการไอโดยเฉพาะตอนนอนในกลางคืน
- ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

การรักษาโรคไขนสอักเสบ ประกอบด้วยหลักใหญ่ ๓ ประการคือ

๑. การให้ยาฆ่าเชื้อโรค (ยาปฏิชีวนะ = ยาแก้อักเสบ)
๒. การทำโพรงจมูกที่บวมให้ยุบลง เพื่อให้หนองในโพรงไขนสไหลถ่ายเทออกมากให้หมด
๓. การหลอกเลี้ยงสิ่งกระตุ้น

๑. การให้ยาฆ่าเชื้อโรค (ยาปฏิชีวนะ = ยาแก้อักเสบ) แพทย์จะเป็นผู้เลือกใช้ยาเหล่านี้ตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคน ระยะเวลาในการใช้ยาจะนานกว่าการรักษาการติดเชื้อของระบบหายใจตามปกติ อาจจะให้นานถึง ๓-๖ สัปดาห์ ตามที่แพทย์จะแนะนำ ซึ่งจะต้องรักษาจนหนองหมดไปจากโพรงไขนส

๒. การทำโพรงจมูกที่บวมให้ยุบลง เพื่อให้หนองในโพรงไขนสไหลถ่ายเทออกมากให้หมด การทำให้โพรงจมูกลดบวมทำได้โดย การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ การใช้ยาพ่นจมูก การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือทำได้ง่าย ๆ โดย

- หากน้ำเกลือหรืออาจผสมขึ้นเองง่าย ๆ โดยใช้น้ำสะอาด ๗๕๐ cc. ผสมกับเกลือสะอาด ๑ ข้อน้ำ หรืออาจใช้ ๐.๙% normal saline ที่ไม่มีน้ำตาลผสมอยู่

- เทน้ำเกลือลงในแก้วสะอาด
- ดูดน้ำเกลือจากแก้วสะอาดเข้าในถุงยางหรือหลอดฉีดยา (Syringe)
- พ่นน้ำเกลือจากถุงยางหรือหลอดฉีดยาเข้าในจมูกในท่าก้มหน้า กลืนหายใจระหว่างฉีดน้ำเกลือเข้าสู่จมูก

- ทำขั้นตอนน้ำมุกhardt ปฏิบัติวันละ ๒-๓ ครั้ง ตามคำแนะนำของแพทย์
- บางครั้งแพทย์อาจสั่งยาพ่นจมูก หรือยาล้างจมูกให้ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

๓. การหลอกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น

- ผู้ป่วยที่เป็นโรคไซน์สอักเสบจำนวนหนึ่ง (อาจถึงร้อยละ ๕๐) อาจจะมีอาการของโรคไซน์สอักเสบที่เนื่องมาจากการคุณภาพของจมูก ซึ่งจะทำให้จมูกบวมและมีอาการติดเชื้อตามมา ผู้ป่วยดังกล่าวควรหลอกเลี่ยงสารแพ้จากไรฝุ่นตามคำแนะนำของแพทย์

- ผู้ป่วยควรหลอกเลี่ยง ควันบุหรี่ การติดเชื้อจากคนรอบข้าง การอยู่ในที่แออัด การว่ายน้ำในสระที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

การติดตามผลการรักษา

เป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้ป่วยควรจะต้องมารับการประเมินผลการรักษาตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง