



โรคฉี่หนู Leptospirosis



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การป้องกัน

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในฉี่ของหนู และสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข
ที่ปนเปื้อนในน้ำเข้าสู่ร่างกาย ทางรอยแผลตามผิวหนัง จากการกินอาหาร และน้ำดื่ม



เลี่ยงการแช่น้ำ
หรือลุยน้ำ



เกษตรกรใช้ถุงมือยาง
และรองเท้านิรภัย



ล้างมือล้างเท้า
ให้สะอาดหลังลุยน้ำ



การปรับปรุง
สภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู

ควบคุมจำนวนหนู ในบริเวณสถานที่ต่าง ๆ



บ้านเรือน
ที่พิกอาศัย



พื้นที่
ทำการเกษตร



บริเวณ
ที่เลี้ยงสัตว์



แหล่งพิกพ่อน
ท่องเที่ยว



ตลาดสด

ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม



การทำจัดขยะ
ไม่เป็นแหล่งอาหาร



ถางหญ้า
ไม่ให้หนูมาทำรัง



กำจัดหนู
โดยวิธีต่าง ๆ



ล้างท่อระบายน้ำ



ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc.12@dc.moph.go.th
กลุ่มเฝ้าระวังความเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422