



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ลunya ระวัง โรคไข้ฉี่หนู Leptospirosis

โรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะที่มีการติดเชื้อ
และปล่อยเชื้อออกมาทั้งปัสสาวะ และแฝงอยู่ในจุดที่
น้ำท่วมขังตามดิน โคลน แอ่งน้ำ หรือ น้ำฉัก โดยเชื้อ
สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน
หรือเยื่อของปาก ตา จมูก

ระยะฟักตัวของเชื้อโรค

โดยเฉลี่ยประมาณ 10 วัน
หรืออยู่ในช่วง 4-19 วัน

พาหะหลัก คือ หนู
หรือสัตว์ฟันแทะ

พาหะรอง คือ หมา วัว และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อื่นๆ

วิธีป้องกัน

อาการผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนู

- ☒ ไข้สูงฉับพลัน ปวดศีรษะ
- ☒ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณน่อง โคนขา หรือปวดหลัง
- ☒ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง
- ☒ ต้วเหลือง ตาเหลือง ช้ำ สับสน
- ☒ ไอมีเลือดปน



สวมรองเท้าบูทยาง
เพื่อป้องกันไม่ให้
บาดแผลสัมผัสสน้ำ



หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ
ลุยโคลน



รีบล้างเท้าหรืออาบน้ำ
ทำความสะอาดร่างกาย
โดยเร็ว

จัดทำ 20 ม.ค. 65



ติดตามข่าวสาร
สุขภาพ



โทร 6 ขลุ่ย